

CALENDARIO TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI FRUTTETI "PREVENIRE E' MEGLIO CHE CURARE"

(MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO, AGRUMI)

PERIODO	PRODOTTO	DOSI x 10 lt	NOTE
AUTUNNO Novembre / Dicembre (dopo caduta foglie)	<i>FUNGIDINA</i> + <i>MIBIOL</i> + <i>PYRINEX QUICK</i>	35ml 300 ml 15 ml	bolla, cancri rameali, cocciniglia, uova di insetti e acari
INVERNO Febbraio/Marzo (all'ingrossamento delle gemme)	<i>RAME METALLO WG</i> (o <i>POLTIGLIA BORDOLESE</i>) + <i>MIBIOL</i> + <i>PYRINEX QUICK</i>	40 gr 60 gr 300 ml 15 ml	bolla, gommosi, ticchiolatura, cocciniglia, uova di insetti e acari
PRIMAVERA Marzo / Aprile (dopo fioritura con foglie sviluppate)	<i>FUNGIDINA</i> (o <i>SCOORE 25EC</i>) + <i>CONFIDOR 200SL</i> (o <i>ACTARA</i>)	35 ml 5 ml 5 ml 4 gr	bolla, ticchiolatura, monilia drupacee cancri rameali, oidio, ruggine afidi, cocciniglia
ESTATE (solo in caso di necessità) prodotti a bassa carenza per :	<i>TOPAS</i> (o <i>FOLICUR SE</i>) <i>PYGANIC 1.4</i> (o <i>DECIS JET</i>)	5 ml 30 ml 20 ml 10 ml	ticchiolatura e ruggini per melo e pero afidi, lepidotteri cicaline, nottue, tignola

I nostri consigli:

- ADESIL-A* aggiunto ai trattamenti fogliari migliora aderenza, efficacia, durata e resistenza alle piogge delle miscele
- STIMOLUX* applicato prima e dopo la fioritura attiva l'accrescimento, l'allegagione e l'ingrossamento dei frutti
- LEONARDITE RHUMUS* distribuita nella buca durante l'impianto favorisce l'attecchimento e la crescita delle piante

Raccomandazioni:

- Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde del giorno - Si raccomanda di aspettare tempo stabile e assenza di vento - Stemperare ogni singolo prodotto in poca acqua tiepida prima di diluirlo - Rispettare i tempi di carenza del prodotto – Prima di utilizzare qualsiasi prodotto consultare le istruzioni riportate in etichetta.